

# SEPTORİNOPLASTİ SONRASI GELİŞEN NADİR BİR OLGU : TAPIA SENDROMU

A RARE CASE DEVELOPING AFTER SEPTORHINOPLASTY:  
TAPIA'S SYNDROME  
Laringoloji

Başvuru: 01.11.2024  
Kabul: 24.03.2025  
Yayın: 24.03.2025

**Gökhan Furkan Kılıç<sup>1</sup>, Seda Nur Saka<sup>1</sup>, Oğuz Can Karakas<sup>1</sup>, Deniz Baklacı<sup>1</sup>, Duygu Erdem<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

## Özet

Tapia sendromu, rekürren laringeal ve hipoglossal sinirlerin hasar görmesi sonucu gelişen nadir bir durumdur. 45 yaşındaki bir kadın hastada septorinoplasti sonrası ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve dil hareketlerinde zorluk gözlemlenmiştir. Muayenede sol vokal kordun paralitik olduğu ve dilin sola deviye olduğu saptanmıştır. Nöroloji konsültasyonu sonrası santral bir neden bulunamamış ve Tapia sendromu teşhisi konulmuştur. Aktaş ve arkadaşları tarafından önerilen sınıflama doğrultusunda olgu, grade 2 olarak değerlendirilmiş ve 10 gün kortikosteroid tedavisi ile dil-konuşma terapisi uygulanmıştır. 6. ay muayenesinde, dil hareketleri normale dönmüş ancak sol vokal kord hareketlerinde kısıtlılık devam etmiştir. Sonuç olarak; Tapia sendromu, endotrakeal anestezi sonrası nadir bir komplikasyon olarak ele alınmalıdır ve cerrahlar ve anestezi uzmanları tanı ve tedavi süreçlerinde dikkatli olmalıdır.

## Abstract

Tapia syndrome is a rare condition caused by damage to the recurrent laryngeal and hypoglossal nerves. In this case report, a 45-year-old female patient developed hoarseness, difficulty swallowing, and impaired tongue movement after septorhinoplasty. Examination revealed paralysis of the left vocal cord and deviation of the tongue to the left on protrusion. After a neurology consultation, no central cause was identified, and it was determined that the patient had developed Tapia syndrome. Based on the classification proposed by Aktaş et al., the case was graded as grade 2, and the patient was treated with corticosteroids for 10 days, alongside speech and language therapy. At the 6-month follow-up, normal tongue movement was observed, but restriction in left vocal cord movement persisted. In conclusion, Tapia syndrome should be considered a rare complication following endotracheal anesthesia. Both surgeons and anesthesiologists must be cautious during diagnosis and treatment processes.

**Anahtar kelimeler:** Dil, Paralizi Vokal Kord

**Keywords:** Paralysis, Tongue Vocal Cord

## Giriş

Tapia sendromu, 1904 yılında A. Garcia Tapia tarafından tanımlanmış olup rekürren laringeal sinir ve hipoglossal sinirin ekstrakranial tutulumu olarak bilinir [1]. O zamandan bu yana çoğunuğu travmatik kökenli olan ve geri kalanı çeşitli cerrahilerle ilişkili çok sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir [2]. Günümüzde bu sendrom, dil ve vokal kordun unilateral felci ile karakterize edilmektedir. Bu bozukluğun olası nedeni, 10. ve 12. kraniyal sinirlerin yaralanmasıdır; ancak 10. sinirinfarengeal dallarının etkilenmediği görülür [3]. Bu yüzden genellikle yumuşak damak normal işlevini görür.

Bu olgu sunumunda kliniğimizde yapılan bir operasyon sonrası gelişen ve nadir bir durum olan Tapia sendromu olgumuzu sunmaktayız.

## Olgu Sunumu


Sorumlu Yazar: Seda Nur Saka, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi  
bülent ecevit üniversitesi hastanesi kbb servisi 2. kat esenköy kozlu  
sedanur.saka26@gmail.com

45 yaşında kadın hasta burundan nefes alma güçlüğü şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın mevcut şikayetleri dikkate alınarak hastaya septorinoplasti operasyonu planlandı. Operasyon öncesi rutin olarak genel anestezi hazırlığı yapıldı. Hastanın daha önce geçirilmiş total tiroidektomi öyküsü vardı. Hastaya preoperatif dönemde yapılan indirekt laringoskopi muayenesinde vokal kordların bilateral hareketli olduğu izlendi. Hasta anestezi ekibi tarafından entübe edildi. Entübasyon sırasında zorluk görülmedi, endotrakeal tüp alt dudak orta hatta sabitlendi. Operasyon süresince hastanın başı hafif fleksiyonda kalacak şekilde alttan desteklendi ve boyun desteği sağlandı. Ardından hastanın septorinoplasti operasyonu gerçekleştirildi. Ekstübasyon sonrası hastada ses kısıklığı geliştiği görüldü. Postoperatif dönemde hasta ses kısıklığı, yutmada ve dil hareketlerinde zorluk şikayetleri olduğunu söyledi. Hastaya yapılan muayenede belirgin dizartrisi olduğu, dilini dışarı çıkarttığında dilin sola deviye olduğu gözlemlendi (Şekil 1).



**Şekil 1 :** Postoperatif dönemdeki dilin sola deviye görünümü.

Uvulada herhangi bir asimetri yoktu. Yapılan indirekt laringoskopide sol vokal kordun paralitik olduğu görüldü (Şekil 2).



**Şekil 2 :** Postoperatif dönemdeki indirekt laringoskopi altında sol vokal kordun paralitik görünümü.

Hasta nöroloji bölümünde konsulte edildi ve yapılan tetkikler sonucu santral bir neden bulunamadı. Bunun üzerine hastada Tapia sendromu geliştiği düşünüldü. Hasta Aktaş ve arkadaşları tarafından yapılan sınıflamaya göre derecelendirildi ve grade 2 olarak kabul edildi. Hastaya ilk dozu 100 mg/gün olmak üzere günlük 10 mg azalacak şekilde prednizolon tedavisi verildi. Ayrıca hastanın dil-konuşma terapisti desteği olması sağlandı. Hastanın tedavi sonrası 10. günde yapılan muayenesinde dil hareketlerinin büyük oranda normale döndüğü, yutma güçlüğüünün geçtiği görüldü (Şekil 3). Ancak ses kısıklığı devam etmekteydi. Postoperatif 6. ay muayenesinde sol vokal kord hareketlerinin kısıtlı olduğu görüldü. Hastanın takibi halen tarafımızca yapılmaktadır.



**Şekil 3 :** Tedavi sonrası dilin orta hatta görünümü.

## Tartışma

Tapia sendromu, esas olarak klinik bulgulara dayanarak yapılan bir dışlama tanısıdır. Belirtilerin başlaması genellikle orotrakeal entübasyon geçiren hastaların ekstübasyonu sonrasında hızla gerçekleşir. Belirtiler arasında ses kısıklığı, konuşma ve yutma güçlükleri ve dilin uzatıldığında ipsilateral sapması bulunur.

Teorik olarak, sinirin yolunda, santral (intrakraniyal) veya periferik (ekstrakraniyal) olarak herhangi bir yerde yaralanma meydana gelebilir. Diğer bulguları dışlamak ve nedenin merkezi mi yoksa periferal mi olduğunu doğrulamak için ayrıntılı bir öykü almak ve kapsamlı bir nörolojik muayene yapmak çok önemlidir. Santral tip Tapia sendromu son derece nadirdir [4].

Ses kısıklığı veya geçici yutma güçlüğü, zorlu veya uzun süreli endotrakeal entübasyonlardan sonra sıkça görülür. Bu semptomlar genellikle belirli bir tedaviye ihtiyaç duymadan kısa bir süre içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak, cerrahi sonrası kranial sinir yaralanmaları nadirdir. Bu tür yaralanmaların iki olası mekanizması vardır. Birincisi, sinirlerin etrafında yapılan işlemlerle, yani boyun veya kafatası tabanı bölgelerinde yapılan cerrahilerde, cerrah tarafından doğrudan manipülasyon yoluyla sinirlerin zarar görmesidir. İkinci olarak entübasyon veya ekstübasyon sırasında ya da uzun süreli baş dorsifleksiyonu sırasında zarar meydana gelebilir [2]. Literatürde entübasyon sonrası izole unilateral veya bilateral hipoglossal sinir hasarları bildirilmiştir ve hasarın mekanizması, basın aşırı fleksiyonu ve boğaz paketinin (oro-faringeal bölgede sıkça yerleştirilmiş) rutin intübasyon sırasında dilin lateral köklerine uygulanan basınç nedeniyle nöroprazy kökenli olduğu düşünülmektedir [5]. Bu tür yaralanmalar için en savunmasız kranial sinirler, abducens, lingualis, hipoglossal ve vagus sinirlerinin dallarıdır [2].

Tapia sendromu tipik olarak, dilin tabanında ve piriform fossada hipoglossal ve rekürren laringeal sinirlere doğrudan travma sonucu ortaya çıkan tek taraflı periferal sinir hasarı olarak görülür. Vakaların çoğu iyatrojenik olup, herhangi bir cerrahi işlem sırasında anestezi için orotrakeal entübasyon sırasında meydana gelir [4]. Semptomlar bizim vakamızda olduğu gibi postoperatif dönemde hasta uyanır uyanmaz hemen ortaya çıkar [6]. Bunun yanında sinir hasarı, yoğun bakım ortamında uzun süreli entübasyon ve mekanik ventilasyon sırasında da meydana gelebilir [4].

2010 yılında Aktaş ve Boğa henüz doğrulanmamış bir Tapia sendromu sınıflandırma ve tedavi protokolü önermiştir [3].

- **Grade I (Hafif Tip):**

- **Belirtiler:** Unilateral vokal kord ve dil felci, uvula deformasyonu yok, minimal konuşma yavaşlaması, dilde şişlik yok, yutma gücü yok.
- **Tedavi:** Kortikosteroid tedavisi önerilmez, yalnızca takip yeterlidir.

- **Grade II (Orta Tip):**

- **Belirtiler:** Unilateral vokal kord ve dil felci, uvula deformasyonu yok, hafif konuşma yavaşlaması, dilde şişlik, farenks kuruluğu, yutma gücü, çatallanmış konuşma.
- **Tedavi:** 15 gün kortikosteroid tedavisi önerilir (ilk 3 gün intravenöz; sonrasında oral yolla devam edilir).

- **Grade III (Şiddetli Tip):**

- **Belirtiler:** Unilateral vokal kord ve dil felci, belirgin uvula deformasyonu, belirgin konuşma gücü, dilde şişlik, farenks kuruluğu, yutma gücü, beslenme ve içme zorlukları.
- **Tedavi:** 1 hafta intravenöz kortikosteroid (1 mg/kg/gün) önerilir. İlk haftanın sonunda, 15 gün boyunca oral kortikosteroid tedavisi (Ultran 5 mg/gün) uygulanmalıdır.

Bu sınıflamaya göre bizde olgumuzu grade 2 olarak değerlendirdik ve tedavi şemasını modifiye ederek 10 gün boyunca kortikosteroid tedavisi verdik. 10. gün sonunda hastamızın dil hareketleri büyük oranda normale dönmüştü. Hastanın yapılan 6. ay muayenesinde dil hareketlerinin tamamen normale döndüğü, sol vokal kord hareketlerinde kısıtlılık olduğu görüldü. Farklı makalelerde, sistemik steroidler (kısa süreli) ve vitamin B kompleksinin yanı sıra konuşma ve yutma terapisi dahil olmak üzere konservatif ve destekleyici yönetim uygulanmış ve hastaların iyileşmelerini artırmak için önerilmiştir [7]. İyileşme süresi 3 ila 22 ay arasında değişir ve medyan 9 ila 12 aydır. İyileşme hastaların yaklaşık %30'unda tamamlanır, %39'unda tamamlanmaz ve %26'sından fazlasında ise sağlanamaz [3].

## Kaynaklar

1. Tapia AG: Un caso de parálisis del lado derecho de la laringe y de la ungue, con parálisis del extero- cleidomastoidea y trapecio del mismo lado. Siglo Medica 52:211–213, 1905
2. Yavuzer R, Baştürki Y, Ozköse Z, Yücel Demir H, Yılmaz M, Ceylan A. Tapia's syndrome following septorhinoplasty. Aesthetic Plast Surg. 2004 Jul-Aug;28(4):208-11. doi: 10.1007/s00266-003-3037-7. PMID: 15599532.
3. Boğa I, Aktas S. Treatment, classification, and review of Tapia syndrome. J Craniofac Surg. 2010

- Jan;21(1):278-80. doi: 10.1097/SCS.0b013e3181c678f0. PMID: 20098201.
- 4. Wei R, De Jesus O. Tapia Syndrome. 2024 Jun 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 33620824.
  - 5. Tesei F, Poveda LM, Strali W, Tosi L, Magnani G, Farneti G. Unilateral laryngeal and hypoglossal paralysis (Tapia's syndrome) following rhinoplasty in general anaesthesia: case report and review of the literature. *Acta Otorhinolaryngol Ital.* 2006 Aug;26(4):219-21. PMID: 18236639; PMCID: PMC2640002.
  - 6. Almeidaa, M., Capitāob, M., Argemiroa, G., & Matiasa, F. The Unknown but Benign T The Unknown but Benign Tapia Syn-apia Syn-drome.
  - 7. Varedi P, Shirani G, Karimi A, Varedi P, Khiabani K, Bohluli B. Tapia syndrome after repairing a fractured zygomatic complex: a case report and review of the literature. *J Oral Maxillofac Surg.* 2013 Oct;71(10):1665-9. doi: 10.1016/j.joms.2013.05.019. Epub 2013 Jul 11. PMID: 23850042.

### Sunum Bilgisi

Bu olgu sunumu 45. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Elexus Kongre Merkezi/Kıbrıs'ta 23-27 Ekim 2024 tarihlerinde e-poster olarak sunulmuş olup herhangi bir dergide yayınlanmamıştır.